

Skjerpede smittevern- og hygienetiltak for fjørfe i hele landet

Med påvist fugleinfluensa hos villfugl i Norge, er det viktig å ha kontroll på smittevern- og hygienetiltakene ved egne dyrehold og ved rugerier og slakterier.

Hele Sør-Norge, inkludert Trøndelag, er definert som *høyrisikoområde* (fra 10.12.2020). Det innebærer blant annet portforbud for all tamfugl. Fuglene skal som minimum holdes under tak, fysisk avskjermet fra villfugl. Alle fjørfeprodusenter med egne private *overflatevannkilder* er pålagt desinfeksjon av drikkevannet. Mattilsynet forventer ellers at alle har oppdaterte smittevernplaner.

Hvilke områder som til enhver tid er definert som *høyrisikoområder* står oppført nederst i *Forskrift om høypatogen aviær influensa*: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-05-1417?q=h%C3%B8ypatogen>

Fjørfeingas etterlevelse av smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for fjørfe er avgjørende for å minimere risikoen for å få inn smitte. Fås smitte inn i én virksomhet, kan alle dyrehold innen ti kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, mm. Det vil sannsynligvis være smittefare knyttet til villfugl gjennom vinteren og eventuelt også under vårtrekkene.

Særlig er det viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra virksomhetene.

Anbefalinger for hele landet

1. **Se til at din smittevernplan er oppdatert** og at alle som er inne i fjørfehuset kjenner til og følger denne.
2. **Begrens trafikk** til og fra virksomheten til det absolutt nødvendige. Fjørfeingas anbefaler at forskriftsfestede KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gjenopptas fra midten av januar. Andre typer besøk bør utgå enn så lenge.
3. **Vask og desinfiser ramper og plattinger** ved mottak av fjørfe og etter henting av egg. Se til at eggtransportør bruker eget skotøy / overtrekk på rampen til egglageret. Desinfiser gulv i egglageret etter henting.

Ekstra tiltak i *høyrisikozonen*

4. **Alt fjørfe skal holdes under tak, fysisk atskilt fra villfugl.**
5. **Hvis egen overflatevannkilde, sjekk at forbehandlingsanlegget, inkludert desinfeksjon, er i orden! Påbudt!**
6. **Ta av uteskotøy ved inngang.** Ha egne sko i uren sone. Dette kommer i tillegg til vanlig skifte ved smitteslusa (punkt 9).
7. KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt. **Unntaket er i Rogaland**, der risikoen for smitte nå er størst og smitteutbrudd kan få så store konsekvenser. Derfor kan det her kun gjennomføres ett besøk i fjørfebesetninger per dag, forutsatt dusjing og bruk av rent sko- og klestøy.
8. **Fortsatt stopp i gårdssalg i Rogaland** - av egg og andre produkter direkte fra gården.

Som alltid gjelder også følgende

9. **ALT personell som skal inn skal bruke smitteslusa** – også plukkepersonell. Skifte av skotøy og ytterklær og vask av hender.
10. **Før besøkslogg** med tanke på smittesporing
11. **Ha faste plasser for kjøretøy**, så kryssforurensning mellom egne kjøretøy og næringskjøretøy unngås
12. **Unngå å tiltrekke villfugl** ved at de har tilgang til kraftfôrsøl (under silo), eggspøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.

Husk varslingsplikten i fugleinfluensaforskriften, § 3:

«Eier eller ansvarlig for dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår»:

- Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
- Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
- Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
- Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

Om fugleinfluensaen i vinter - se <https://mattilsynet.no> og <https://vetinst.no>, Om fugleinfluensa generelt - se: <https://animalia.no/fugleinfluensa>, Om smittebeskyttelse - se <https://animalia.no/smittebeskyttelse>, Om spesielle råd mht desinfeksjonsmidler og drikkevannsbehandling - se <https://www.animalia.no/no/animalia/aktuelt/fugleinfluensa-i-vestlandet/>