


Behandling av nedkjølte lam



1. Moderat nedkjølte lam (37 – 39°C) trenger ett mål med kroppsvarm råmelk via sonde eller flaske. De kan forbli sammen med mora, men trenger lune og varme omgivelser og litt ekstra oppfølging.
2. Alvorlig nedkjølte lam (< 37°C) som er yngre enn 5 timer kan varmes opp direkte fordi de har brunt fett til forbrenning. Når de har nådd en kroppstemperatur på 37°C kan de få et mål råmelk. Slike lam vil være slappe og det vil være nødvendig å bruke sonde.
3. Alvorlig nedkjølte lam som er ved bevissthet og er eldre enn 5 timer MÅ tilføres næring før de varmes opp. Det er viktig da oppvarming setter i gang forbrenningen og til det kreves energi.
4. Alvorlig nedkjølte lam som er eldre enn 5 timer men ikke er ved bevissthet, trenger veterinærbehandling i form av sukkerinjeksjon direkte i buken.

Oppvarming krever omgivelsestemperaturer opp mot 40 grader. Det kan være en varmekasse med varmelampe eller vifteovn, badegolv eller lignende. Når lammene igjen når 37 grader, trenger de et nytt mål råmelk før de returneres til søya. Lam som ligger i en varmekasse som holder 40°C må fjernes fra denne når de har kommet opp i 37°C for å unngå overoppheeting. Er man usikker på alderen til et nedkjølt lam, er det tryggeste å alltid gi råmelk før oppvarming. Å legge ned sonde er enkelt når man kan det, men første gang kan det være lurt å be den lokale veterinær om å demonstrere teknikken. Går sonden ned i luftrøret kveles lammet.